

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA**



**CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CANINOS DE RAZA
PURA CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD
METABÓLICA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL
VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA**

SOFÍA ISABEL LÓPEZ RIVERA

Médica Veterinaria

GUATEMALA, OCTUBRE DE 2019

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA**



**CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CANINOS DE RAZA PURA
CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD METABÓLICA
ATENDIDOS EN EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PRESENTADO A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD

POR

SOFÍA ISABEL LÓPEZ RIVERA

Al conferírsele el título profesional de

Médica Veterinaria

En el grado de Licenciado

GUATEMALA, OCTUBRE DE 2019

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
JUNTA DIRECTIVA**

DECANO:	M.A. Gustavo Enrique Taracena Gil
SECRETARIO:	M.V. Hugo René Pérez Noriega
VOCAL I:	MSc. Juan José Prem González
VOCAL II:	Lic. Zoot. Miguel Ángel Rodenas Argueta
VOCAL III:	Lic. Zoot. Alex Rafael Salazar Melgar
VOCAL IV:	Br. Yasmín Adalí Sian Gamboa
VOCAL V:	Br. Maria Fernanda Amézquita Estévez

ASESOR

MV. JUAN JOSÉ CHÁVEZ LÓPEZ

MSc. DANIELA MARIEL VILLATORO CHACÓN

HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR

En cumplimiento con lo establecido por los reglamentos y normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presento a su consideración el artículo científico aceptado para publicación en una revista indexada, titulado:

CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CANINOS DE RAZA PURA CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD METABÓLICA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Que fuera aprobado por la Honorable Junta Directiva de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Como requisito previo para optar al título de:

MÉDICA VETERINARIA

[Home](#)[About Us](#)[Journals](#)[Contact](#)

Letter Of Acceptance

Official Provisional Acceptance for Publication of Academic Research/Review Paper

Dear Sofia Isabel Lopez Rivera, Julia Patricia Laparra Galindo, Juan Jose Chavez Lopez, Daniela Mariel Villatoro Chacon,

Your research paper entitled, "Caracterizacion De Pacientes Caninos De Raza Pura Con Diagnostico De Enfermedad Metabolica..." submitted for publication in the Global Journal of Medical Research, has been provisionally accepted by the peer reviewers, editorial board members, chief author, and chief editor.

This email is an official provisional confirmation of its acceptance. Per our ethics, the paper is now under the copyright privilege of Global Journals Incorporated and therefore cannot be further published or reproduced as a whole or in part elsewhere without prior permission.

The research paper is expected to be published in GJMR Volume 19 Issue 2 Version 1.0

Please acknowledge this email.

Yours Sincerely,



Dr. Vivek Dubey

Ph.D., MS, FARSE

University of Wisconsin

Editor-in-Chief,

Global Journals Incorporated, USA

e: editorusa@globaljournals.org

ACTO QUE DEDICO A:

- A DIOS:** Que me ha llenado de bendiciones a lo largo de mi vida, permitiéndome completar este logro más.
- A MI MADRE** Por ser mi modelo a seguir en todo, por enseñarme a trabajar duro por lo que uno desea, a nunca rendirse, a hacer las cosas bien desde el principio, por sus consejos tan sabios toda la vida y sobre todo por su paciencia.
- A MI HERMANO:** Por ser mi mejor amigo, mi consejero, el ejemplo de profesional que uno debe ser.
- A MIS AMIGOS:** Por apoyarme y estar presente toda la carrera.

AGRADECIMIENTOS

A MI ASESOR:

M.V. Juan José Chávez López por todos los conocimientos compartidos, guía y apoyo constante.

A DANIELA VILLATORO:

Por su apoyo y conocimientos.

A PATRICIA LAPARRA:

Coautora de este artículo y mi amiga

A MIS CATEDRÁTICOS:

Por todas las enseñanzas y conocimiento compartido durante mi formación como profesional.

ÍNDICE

I. Resumen	2
II. Introducción	4
III. Materiales y métodos	5
IV. Resultados	7
V. Discusión	12
VI. Agradecimientos	17
VII. Referencias.....	18



GLOBAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH: G
VETERINARY SCIENCE AND VETERINARY MEDICINE
Volume 19 Issue 2 Version 1.0 Year 2019
Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal
Publisher: Global Journals
Online ISSN: 2249-4618 & Print ISSN: 0975-5888

Caracterización de Pacientes Caninos de Raza Pura Con Diagnóstico de Enfermedad Metabólica Atendidos en el Hospital Veterinario de la Universidad de San Carlos de Guatemala

By López-Rivera, Sofía Isabel, Laparra-Galindo, Julia Patricia, Chávez-López, Juan José & Villatoro-Chacón, Daniela Mariel

Resumen- Los perros de raza pura han brindado información sobre la morfología, el comportamiento y las enfermedades caninas siendo la diversificación de las mismas lo que ha llevado al desarrollo de enfermedades metabólicas, las cuales son causadas por anomalías en sistemas enzimáticos. El presente estudio fue realizado en el Hospital Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el cual se evaluaron 406 fichas clínicas de pacientes caninos de raza pura de las cuales 48 eran correspondientes con un diagnóstico definitivo de enfermedad metabólica. De los pacientes evaluados, las cuatro razas de mayor presencia fue el Labrador Retriever 17%, Husky Siberiano 13%, French Poodle 10% y Schnauzer 8%.

Palabras clave: canino, raza pura, genética, metabolismo, obesidad, hipotiroidismo, urolitiasis, diabetes mellitus.

GJMR-G Classification: NLMC Code: WA 360



CARACTERIZACION DE PACIENTES CANINOS DE RAZA PURA CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD METABOLICA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Strictly as per the compliance and regulations of:



© 2019. López-Rivera, Sofía Isabel, Laparra-Galindo, Julia Patricia, Chávez-López, Juan José & Villatoro-Chacón, Daniela Mariel. This is a research/review paper, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/>, permitting all non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

I. RESUMEN

Los perros de raza pura han brindado información sobre la morfología, el comportamiento y las enfermedades caninas siendo la diversificación de las mismas lo que ha llevado al desarrollo de enfermedades metabólicas, las cuales son causadas por anomalías en sistemas enzimáticos. El presente estudio fue realizado en el Hospital Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el cual se evaluaron 406 fichas clínicas de pacientes caninos de raza pura de las cuales 48 eran correspondientes con un diagnóstico definitivo de enfermedad metabólica. De los pacientes evaluados, las cuatro razas de mayor presencia fue el Labrador Retriever 17%, Husky Siberiano 13%, French Poodle 10% y Schnauzer 8%. Entre las enfermedades metabólicas observadas en el estudio se encontraron: la obesidad y el hipotiroidismo en un 27% cada una, enfermedad renal 25%, urolitiasis 17% y diabetes mellitus 4%.

El propósito del estudio fue obtener una perspectiva general de la predisposición racial de desórdenes metabólicos en caninos de raza pura así como la relación clínica que estos tienen con otros factores tales como la condición corporal, estado reproductivo y sexo.

Palabras claves: Canino, raza pura, genética, metabolismo, obesidad, hipotiroidismo, urolitiasis, diabetes mellitus.

I. ABSTRACT

Purebred dogs have provided information on the morphology, behavior and canine diseases being the diversification of them which has led to the development of metabolic diseases, which are caused by abnormalities in enzymatic systems. The present study was carried out in the Veterinary Hospital of the Faculty of Veterinary Medicine and Zootechnics of the University of San Carlos of Guatemala in which 406 clinical records of purebred dogs were evaluated, of which 48 were for a definitive diagnosis of disease metabolic. Of the patients evaluated, the four races with the greatest presence were the Labrador Retriever 17%, Siberian Husky 13%, French Poodle 10% and Schnauzer 8%. Among the metabolic diseases observed in the study were: obesity and hypothyroidism in 27% each, kidney disease 25%, urolithiasis 17% and diabetes mellitus 4%.

The purpose of the study was to obtain a general perspective of the racial predisposition of metabolic disorders in dogs of the breed, as well as the clinical relationship with other factors such as body condition, reproductive status and sex.

Keywords: Canine, pure breed, genetics, metabolism, obesity, hypothyroidism, urolithiasis, diabetes mellitus.

II. INTRODUCCIÓN

Los seres humanos han ejercido distintas selecciones en los perros desde su domesticación como lobos hasta la diversidad de razas que conocemos actualmente. A lo largo de esto, ha intervenido la selección natural durante su adaptación a un estilo de vida domesticado seguido de una intensa selección artificial durante la formación de razas modernas (Deane, Chu, Slavney, Boyko, & Sams, 2018). Los perros de raza pura han brindado información sobre la morfología, el comportamiento y las enfermedades, siendo la diversificación de las mismas lo que ha llevado al desarrollo de trastornos. (Sutter & Ostrande, 2004).

Análisis realizados en 2017 indican las diferencias metabólicas entre los tamaños corporales de distintos caninos. Estas diferencias reflejan no solo la variabilidad inducida morfológicamente sino también las diferencias genéticas metabólicas específicas asociadas con la creación de razas debido a la selección artificial (Middleton et al., 2017). Las enfermedades metabólicas son aquellas patologías causadas por anomalías en sistemas enzimáticos implicados en el metabolismo. Las anomalías congénitas son producidas por alteraciones genéticas que van a dar lugar a enzimas defectuosas (errores congénitos del metabolismo), mientras que las adquiridas son debidas a enfermedades de órganos endócrinos o al fallo de órganos metabólicamente activos (Mayor & Cascales, 2006). Actualmente algunas de las enfermedades metabólicas que afectan a los caninos son la obesidad, insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, hipotiroidismo, desórdenes en la glándula paratiroides, hipertiroidismo, hiperadrenocorticismos, entre otras (Aillón & Enríquez, 2013; Catherin, Moncrieff & Guptyll, 2010). En Guatemala no se poseen estudios publicados sobre las enfermedades metabólicas que afectan a los caninos específicamente según la raza que estos sean.

El presente estudio se realizó en el Hospital Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (HVAC) de la Universidad de San Carlos siendo éste el

único hospital universitario veterinario, con atención al público en el cual se reciben pacientes con todo tipo de afecciones, entre las cuales se encuentran las de origen metabólico. El propósito del estudio fue obtener una perspectiva general de la predisposición racial de ciertos desórdenes metabólicos en caninos así como la relación clínica que estos tienen con la condición corporal, estado reproductivo y sexo. Así mismo generar una fuente de información que puede ser útil para mejorar los registros del hospital y contribuir a en el ámbito de la investigación. Es importante tomar en cuenta que en el estudio la mayor parte de los caninos pertenecían a zona 12 y Mixco, zona en la que se encuentra ubicado el hospital y que forman parte de la ciudad capital respectivamente.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio fue realizado en el Hospital Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnica de la Universidad de San Carlos de Guatemala ubicado en la zona 12 de la ciudad capital con coordenadas UTM al Este 763330 y Norte 1613701.

Dentro de los parámetros a tomar en consideración se incluyó que fueran caninos de raza pura, su estado reproductivo, condición corporal y sexo. Se excluyó cualquier dato que no cumpliera con los parámetros antes mencionados.

Los datos fueron tomadas de todas las fichas clínicas de los pacientes correspondientes al mes de julio 2017 - enero 2018. Las mismas debían pertenecer a pacientes con diagnóstico definitivo de enfermedad metabólica siendo éstos corroborados con exámenes complementarios de laboratorio realizados en dicho centro de estudio así como el respaldo de su ficha clínica.

Para el análisis se realizó un estudio retrospectivo evaluando 406 fichas clínicas de pacientes caninos, de las cuales 48 correspondían a pacientes con un diagnóstico definitivo de enfermedad metabólica.

El análisis de datos se utilizó estadística descriptiva en la cual se clasificaron de acuerdo a raza, sexo, estado reproductivo, condición corporal y diagnóstico final.

Las pruebas diagnósticas a utilizar según la enfermedad fueron las siguientes:

Enfermedad	Ayuda Diagnóstica											
	Hemograma	GPT	Urianálisis	Glucosa	Creatinina	Urea	BUN	Colesterol	T4 libre	US	Ex. Fecal	Urocultivo
Hipotiroidismo	X	X	X					X	X			
Enfermedad Renal Crónica	X	X	X		X	X	X			X		X
Diabetes Mellitus	X	X	X	X	X		X	X				
Urolitiasis	X		X		X	X	X			X		

IV. RESULTADOS

TABLA 1

NUMERO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD METABÓLICA SEGÚN RAZA

Raza	No.	%
Alaska Malamute	1	2%
Bichón Habanero	1	2%
Bull terrier inglés	1	2%
Collie	1	2%
Dálmata	1	2%
Dobermann	1	2%
Pastor alemán	1	2%
Rottweiler	1	2%
Samoyedo	1	2%
Bulldog Inglés	2	4%
Dachshund	2	4%
Shih tzu	2	4%
Cocker Spaniel Inglés	3	6%
Golden retriever	3	6%
SRD	4	8%
Schnauzer	4	8%
French Poodle (Caniche)	5	10%
Husky siberiano	6	13%
Labrador retriever	8	17%
	48	100%

TABLA 2
DESÓRDENES METABÓLICOS EN EL HVAC

Enfermedad	No.	%
Obesidad	13	27%
Hipotiroidismo	13	27%
Enfermedad Renal Crónica	12	25%
Urolitiasis	8	17%
Diabetes	2	4%
	48	100%

TABLA 3
PORCENTAJE DE CANINOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD METABÓLICA SEGÚN SEXO

Sexo	Pacientes	Esterilizados	No esterilizados	FI	Porcentaje
Hembras	27	11	13	1	56.25%
Machos	21	7	12	3	43.75%
Total	48	18	25	5	100%

TABLA 4
ENFERMEDADES METABÓLICAS SEGÚN RAZA

Enfermedad según raza	
Labrador Retriever	Obesidad
	Hipotiroidismo
	Diabetes Mellitus
	Urolitiasis
	Enfermedad Renal Crónica
Husky Siberiano	Obesidad
	Hipotiroidismo
	Urolitiasis
	Enfermedad Renal Crónica
	Enfermedad Renal Crónica
French Poodle	Obesidad
	Hipotiroidismo
	Diabetes Mellitus
	Urolitiasis
	Enfermedad Renal Crónica
Schnauzer	Obesidad
	Hipotiroidismo

TABLA 5

CANTIDAD Y PORCENTAJE DE CANINOS SEGÚN CONDICIÓN CORPORAL

Condición Corporal	Cantidad	%
1	2	4%
2	2	4%
3	4	8%
4	11	23%
5	5	10%
6	2	4%
7	5	10%
8	14	29%
9	2	4%
FI	1	2%
	48	100%

TABLA 6

CANTIDAD DE PACIENTES CON ENFERMEDAD METABÓLICA Y SU LOCALIDAD

Localidad	Pacientes
Zona 12	7
Zona 13	4
Zona 7	4
Zona 8	1
Zona 10	1
Zona 11	4
Zona 17	2
Zona 18	1
Zona 19	2
Zona 21	1
Zona 5	1
Mixco	7
Villa Nueva	2
Villa Hermosa	1
Villa Canales	1
San José Pinula	1
Carretera a Fraijanes	2
Carretera San Lucas Sacatepéquez	1
Chinautla	2
Escuintla	1
Jalapa	1
Sacatepéquez	1
Total	48

V. DISCUSIÓN

El grupo de estudio se conformó por 406 pacientes del área de Medicina Interna del HVAC, de los cuales 48 tuvieron un diagnóstico final de enfermedad metabólica. Entre las dificultades para la obtención del diagnóstico final estuvo la situación económica por parte de los propietarios, la cual no permitió en algunos casos la realización de ayudas diagnósticas complementarias así como el seguimiento clínico del paciente.

De acuerdo a Gought y Thomas (2004) la mayoría de las enfermedades genéticas reconocidas del perro se heredan de forma autosómica recesiva. Esto puede ser debido a la endogamia, pero también se debe a la dificultad de identificar y eliminar los rasgos recesivos en los programas de mejoramiento. Es común observar que perros cruzados son más sanos que los de raza pura, relacionándose con la endogamia, la cual tiende a enmascarar el efecto de muchos genes recesivos.

La fijación del fenotipo y el apareamiento de individuos relacionados han dado lugar a patrones de enfermedad específicos de raza y variaciones en la esperanza de vida de éstos. (Fleischer, Sharkey, Maeley, Ostrander & Martínez, 2008). Por esto mismo la presencia de enfermedades metabólicas en ciertas razas puras cada vez es más caracterizable y presente en Guatemala.

Dentro del estudio se determinó la condición corporal de los distintos caninos atendidos en el HVAC ya que la obesidad además de ser considerada una enfermedad metabólica se relaciona con el desarrollo de otras afecciones de este tipo. En los pacientes se pudo determinar que solamente el 33% mostraba una condición corporal adecuada en rangos entre 4 – 5 de 9 y un 47% presentó una condición corporal en rangos entre 6 - 9 de 9, siendo éstos últimos ya considerados con sobrepeso y con mayor exposición a un síndrome metabólico. La obesidad canina se asocia con el desarrollo de resistencia a la insulina, perfiles lipídicos alterados e hipertensión leve, que se alivian con la pérdida de peso. Además, los

perros con sobrepeso son más propensos a padecer diabetes mellitus, mientras que la sobrealimentación de por vida conduce a un sobrepeso, trastornos metabólicos y una disminución de la esperanza de vida. (Gought & Thomas, 2004)(Mori et al., 2010). Estudios realizados en Estados Unidos indican que el sobrepeso y la obesidad afectan aproximadamente a 1 de cada 5 perros, habiendo aumentado su prevalencia a un 37% en perros desde 2007. En perros, el 62% con sobrepeso presentan hipotiroidismo (García, 2012) y 5.18 veces más tendientes a padecer insuficiencia renal (Aillón & Enríquez, 2013).

Aunque el número de caninos esterilizados resultó ser menor que el de no esterilizados es importante mencionar que los estrógenos regulan la saciedad a nivel del sistema nervioso central, de modo que tras la castración, sobre todo en las hembras, se produce un aumento del apetito y reducción del índice metabólico, siendo los animales castrados los de mayor probabilidad de padecer sobrepeso u obesidad y por ende una enfermedad metabólica (González & Serrano, 2017). Dentro del estudio se observó que las hembras tuvieron un porcentaje superior que los machos a padecer una enfermedad metabólica correlacionándose con estudios de medicina humana, en los cuales las endocrinopatías se presentan con mayor frecuencia en mujeres (González, 2015). Por ejemplo, entre las endocrinopatías con mayor predisposición en las hembras se encuentra el hipotiroidismo. (MalagaVetSummit, 2017).

Según los resultados el hipotiroidismo y la obesidad resultaron ser los desórdenes de mayor frecuencia en el HVAC con un 27% cada una. El hipotiroidismo es una enfermedad con un rango de aparecimiento medio, usualmente afectando entre los 2-6 años (Gought & Thomas, 2004). Entre las razas con mayor predisposición a la enfermedad y de mayor presencia presentadas en el HVAC se encontraron el Labrador Retriever, Husky Siberiano, Schnauzer y French Poodle.

El protocolo diagnóstico de Ettinger para el hipotiroidismo (Catherin, Moncrieff & Guptyll, 2010) difiere con el HVAC solamente en que no se miden electrolitos ni TSH, debido a que no se encuentra como parte del protocolo la medición de los mismos y no existe dicha prueba en el país. Así mismo se realiza el urianálisis con el fin de no incluir como enfermedad principal la enfermedad de Cushing, la cual presenta signos similares al hipotiroidismo pero densidades urinarias bajas en el 85% de los pacientes (DiBartola, 2010).

De acuerdo a Mori et al. (2010) los Schnauzer miniatura son la primera raza canina reportada en Estados Unidos que suele padecer de hiperlipidemia primaria presentando niveles elevados de triglicéridos plasmáticos y colesterol total. Ambos, signos de hiperlipidemia la cual puede ser provocada por el hipotiroidismo. En el HVAC se presentó un 8% de caninos raza Schnauzer entre los cuales existía diagnóstico de hipotiroidismo. Dentro de las pruebas a realizarse en dicho hospital son los niveles de colesterol, más no de triglicéridos por lo cual el diagnóstico de hiperlipidemia puede llegar a ser inconcluso. Por esta razón sería recomendable agregar como protocolo la medición de estos en todos los animales con énfasis en los Schnauzer. Según un estudio de la red de hospitales estadounidenses Banfield Pet Hospital, el hipotiroidismo se da en 1 de cada 200 perros, además, el 61% de los perros hipotiroideos padecen también sobrepeso u obesidad. (Aillón & Enríquez, 2013).

Seguido del hipotiroidismo, la enfermedad renal crónica resultó ser la segunda enfermedad de mayor apareamiento con un 25%. Las nefropatías crónicas son las enfermedades renales más frecuentes en la clínica de los pequeños animales y una de las principales causas de mortalidad en pacientes de edad avanzada. Ocurre en perros de todas las edades, sexos y razas (Suárez, 2007). De acuerdo con los resultados del HVAC tanto el Husky Siberiano, Labrador Retriever y French Poodle fueron razas que presentaron dicha afección. Según estudios, en esta enfermedad existe una prevalencia general que oscila entre el 0.5 y el 7% en

los perros. (Suárez, 2007). De acuerdo al protocolo de Ettinger (DiBartola, 2010) el HVAC difiere en la medición de la presión sanguínea, la cual no se realiza en el mismo debido a la falta de equipo específico. Esta es aconsejable realizarla ya que la hipertensión suele ser una secuela del fallo renal. Estudios demuestran que la incidencia de hipertensión en perros con fallo renal suele ser del 30 – 93% siendo aquellos con afección glomerular los que en mayor riesgo se encuentran (DiBartola, 2010)..

Luego la urolitiasis resultó ser la tercera enfermedad de mayor prevalencia en el HVAC la cual puede estar asociada a distintos factores tales como raza, sexo, edad y dieta. Según Robles (Robles, 2016) dentro de las razas de mayor tendencia a padecer esta afección se encuentran el Labrador Retriever, Schnauzer y Poodle, mismas presentadas en el estudio con mayor presentación en el HVAC y algunas de ellas con diagnóstico final de urolitiasis. De acuerdo a Robles (2016) estudios anteriores indican que dicha enfermedad tiende a afectar a las razas más pequeñas con mayor frecuencia que las grandes pudiendo relacionarse esto con su menor volumen de orina, y el menor número de micciones, por lo tanto mayor concentración de minerales. La predisposición racial a tipos específicos de minerales sugiere una base genética. (Robles, 2016). Las principales pruebas diagnósticas realizadas en el HVAC cuando se sospecha de urolitiasis son ultrasonido abdominal, urianálisis para determinar qué tipo de cristales se encuentran, urocultivo y análisis del urolito. Seguido de éstas se realizan algunas pruebas básicas como medición de creatinina sanguínea y perfiles proteicos para descartar cualquier tipo de falla renal asociada al urolito. Muchas veces el análisis del urolito es realizado sólo si el dueño puede pagarlo y algunas veces se limita a las pruebas mencionadas anteriormente. El análisis del mismo es para saber su composición ya que dependiendo de ella puede detectarse otro tipo de afecciones tales como las alteraciones hepáticas e hipercalcemia. De mismo modo a partir del análisis de éste se puede saber qué manejo dietético debe seguirse y así evitar la recurrencia de la enfermedad.

En cuanto a la diabetes mellitus se encuentra ampliamente distribuida a nivel de razas de perros tendientes a padecerla. Según los pacientes del HVAC tanto la raza Labrador Retriever como French Poodle resultaron con un diagnóstico concluyente de DM. De acuerdo a Fall et al. (2007) las diferencias significativas de raza, sexo y edad indican que la variación genética podría hacer que las razas sean más o menos susceptibles a diferentes tipos de DM. Se requiere de mayor investigación, principalmente sobre las diferencias entre las distintas características, y los estudios específicos de raza. Así mismo ese mismo estudio realizado en Estados Unidos concluyó que los samoyedos (y todas aquellas razas nórdicas como el Husky Siberiano), los Schnauzers miniatura y el caniche miniatura tenían un alto riesgo de padecer DM; razas presentes dentro de éste mismo estudio. También dentro de ésta enfermedad algunas hembras de raza específica presentan mayor riesgo de sufrirla, sin embargo razas como el Labrador Retriever no poseen preferencia de sexo en cuanto a padecer dicha afección. (Fall, Hansson, Hedhammar, Kampe & Egenvall, 2007)

Dentro del diagnóstico de diabetes mellitus realizado en el HVAC se encuentra la presencia de signos clínicos clásicos como la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Una vez encontrados estos se procede a la medición de glucosa tanto en orina como en sangre. Así mismo se mide la densidad urinaria, hemograma, GPT, perfil renal, creatinina y colesterol en sangre. La batería de pruebas se hace con el fin de descartar cualquier tipo de afección que pueda estar causándola o incrementando su presencia. De acuerdo a Ettinger (Nelson, 2010) otras pruebas a realizar son medición de lipasa pancreática, insulina, concentración de progesterona sérica en hembras sin esterilizar y urocultivo. Sin embargo éstas últimas generalmente no se realizan en el HVAC ya que con las pruebas básicas es posible determinar en gran medida la enfermedad así como por razones económicas antes mencionadas.

VI. AGRADECIMIENTOS

Se agradece a la unidad de Medicina Interna del Hospital Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de San Carlos de Guatemala por haber proporcionado la información correspondiente.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Aillón, A., & Enríquez, S., (2013). Determinación de la prevalencia de las enfermedades metabólicas (cardíacas, hepáticas, renales y obesidad) en caninos del distrito metropolitano de Quito en el período enero – junio del año 2012. 1(1). 14 -31. Recuperado de: <http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/2893>
2. Deane, P., Chu, E., Slavney, A., Boyko, A., & Sams, A., (2018). Direct-to-consumer DNA testing of 6,000 dogs reveals 98.6-kb duplication associated with blue eyes and heterochromia in Siberian Huskies. Plos Genetics. 1(1): 2 Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/328083829_Direct-to-consumer_DNA_testing_of_6000_dogs_reveals_986-kb_duplication_associated_with_blue_eyes_and_heterochromia_in_Siberian_Huskies
3. Ettinger, S., & Feldman, E., (2010) Clinical approach and Laboratory Evaluation. DiBartola, S., Ettinger Textbook of Veterinary Internal. (pp 1716-1730) Elsevier Saunders.
4. Ettinger, S., & Feldman, E., (2010). Diabetes mellitus. Nelson, R., Ettinger Textbook of Veterinary Internal.(pp.1590). Elsevier Saunders.
5. Ettinger, S., & Feldman, E., (2010) Hipotiroidismo. Catherin, J., Moncrieff, S., Guptyll, L., Ettinger Textbook of Veterinary Internal. (pp 1540) Elsevier Saunders.
6. Fall, T., Hansson, H., Hedhammar, A., Kampe, O., & Egenvall, A., (2007). Diabetes Mellitus in a Population of 180,000 Insured Dogs; Incidence, Survival,


and Breed Distribution. (1)(27) 1209- 1216. Recuperado de: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1939-1676.2007.tb01940>.

7. Fleischer, S., Sharkey, M., Maeley, K., Ostrander, E., & Martínez, M., (2008). Pharmacogenetic and Metabolic Differences Between Dog Breeds: Their Impact on Canine Medicine and the Use of the Dog as a Preclinical Animal Model. Springer Link. 10 (1): 110-119. Recuperado de: <https://link.springer.com/article/10.1208/s12248-008-9011-1>
8. García, C., (2012). Estudio sobre el incremento de enfermedades crónicas en perros y gatos. BanfieldPetHospital, Recuperado de: http://www.stateofpethealth.com/pdf/State_of_Pet_Health_2012.pdf
9. González, F., & Serrano, C., (2017). Incidencia de enfermedades endocrinas en caninos entre los años 2013-2016 en un hospital veterinario universitario de Chile. Revista chilena endocrinología. 10 (3): 90-94. Recuperado de: http://revistasoched.cl/3_2017/3.pdf
10. González, J., (2015). Relación de las patologías caninas más frecuentes que se presentan en la clínica de pequeños animales en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, con las variables edad, raza, sexo y tamaño. Universidad Complutense de Madrid. 1(1). 47. Recuperado de: <https://eprints.ucm.es/33266/1/T36414.pdf>
11. Gough, A., & Thomas, A., (2004). Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats. United Kingdom, England. Blackwell Publishing LTD.
12. Málaga Vet Summit. Esterilización: del mito a la realidad.(2017) FYCMA. 1(1) 6-7. Recuperado de: http://www.colvet.es/sites/default/files/2018-02/Dossier_Vet_Summit_2017_Conclusiones_v02.pdf


13. Mayor, F., & Cascales, M., (2006). Enfermedades Metabólicas. 1 (1). 11. Recuperado de: http://200.72.129.100/hso/guiasclinicasneo/17_Enfermedades_Metabolicas_Congenitas.pdf
14. Middleton, R., Lacroix, S., Scott-Boyer, M., Dordevic, N., Kennedy, A., Slusky, A., et al. (2017). Metabolic Differences between Dogs of Different Body Sizes. PMC. 1(1):10 Recuperado de: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5684564/#sec5title>
15. Mori, N., Leea, P., Muranaka, S., Sagara, F., Takemitsu, H., Nishiyama, et al. (2010). Predisposition for primary hyperlipidemia in Miniature Schnauzers and Shetland sheepdogs as compared to other canine breeds. Elsevier. 88(3) 394 - 399. Recuperado de: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0034528809002951>
16. Suárez, M., (2007) Manejo de la enfermedad renal crónica. RECVET. 2 (01-04). 1. Recuperado de: <http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n01a0407/01a040706.pdf>
17. Sutter, N., & Ostrande, E., (2004). Dog star rising: the canine genetic system. Nature Reviews. 1(1) : 1 Recuperado de: <https://nature.com/articles/nrg1492>
18. Robles, B., (2016). Situación actual de la urolitiasis canina en cuatro hospitales de la ciudad de Guatemala. FMVZ. USAC. 1(1) pp. 17. Recuperado de: <http://www.repositorio.usac.edu.gt/5266/1/Tesis%20Med%20Vet%20Blanca%20E%20Robles%20Paredes.pdf>

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA

CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CANINOS DE RAZA PURA
CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD METABÓLICA
ATENDIDOS EN EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA




Br. Sofía Isabel López Rivera



M.V. Juan José Chávez López


ASESOR PRINCIPAL



MSc. Daniela Mariel Villatoro

Chacón
ASESORA

IMPRÍMASE



M.A. Gustavo Enrique Taracena Gil

DECANO

